



TITLE:

Sheaf of Structuresにより保存されるSentenceについて (数学基礎論)

AUTHOR(S):

廣瀬, 健; 高橋, 真

CITATION:

廣瀬, 健 ...[et al]. Sheaf of Structuresにより保存されるSentenceについて (数学基礎論). 数理解析研究所講究録 1979, 362: 157-165

ISSUE DATE:

1979-09

URL:

<http://hdl.handle.net/2433/104550>

RIGHT:

Sheaf of structures により保存される sentence について

早大 理工 廣瀬 健
高橋 真

図に於いて R. Mansfield は "Is every sentence preserved by global sections a Horn sentence?" という問題を提示しているがここではこれに対する肯定的な答を与え、それに関連して、いろいろな Sheaf of structures の global sections により保存される sentence について考察する。

§0 準備

\mathcal{L} : first order language に対し, $M_{\mathcal{L}}$ を \mathcal{L} -structures とその間の homomorphisms とから成る category とする。 X : top. sp. に対し, functor $P: \mathcal{O}(X)^{\text{op}} \rightarrow M_{\mathcal{L}}$ を presheaf of structures と呼ぶ (X, P) と書くことにする。($\mathcal{O}(X)$ は X の open sets 全体のある category) presheaf of structures (X, P) が次の条件 1), 2) を満たす時 Sheaf of structures と呼ぶ。

1) $\forall U \in \mathcal{O}(X) \ \forall \{U_{\alpha}\}_{\alpha \in A}$: open covering of $U \ \forall \{a_{\alpha}\}_{\alpha \in A}$ s.t. $a_{\alpha} \in P(U_{\alpha})$

に対し $\forall \alpha, \beta \in A \quad P_{u_\alpha \cup u_\beta}^u(a_\alpha) = P_{u_\alpha \cup u_\beta}^u(a_\beta) \implies \exists! a \in P(u) \quad \forall \alpha \in A \quad P_{u_\alpha}^u(a) = a_\alpha$

2) $\forall R(x_1, \dots, x_n)$: atomic formula $\forall u \in \mathcal{O}(X) \quad \forall \{u_\alpha\}_{\alpha \in A}$: open covering of u

$\forall a_1, \dots, a_n \in P(u)$ に対し

$$\forall \alpha \in A \quad P(u_\alpha) \models R(P_{u_\alpha}^u(a_1), \dots, P_{u_\alpha}^u(a_n)) \implies P(u) \models R(a_1, \dots, a_n)$$

(P_α^u は P により決まる $P(u)$ から $P(u_\alpha)$ への homomorphism)

P_x を $x \in X$ に於ける P の stalk とする。 P_x^u を P により決まる

$P(u)$ から P_x への canonical map とする。 $P_x^u(a)$ を $[a]_x$ と書く

ことにする。 C : constant symbol in \mathcal{L} に対し C の P_x での解釈

C_{P_x} を $C_{P_x} = [C_{P(u)}]_x$ for some $u \ni x$ により, また f : n -ary function

symbol in \mathcal{L} に対し f の P_x での解釈 f_{P_x} を $b_1, \dots, b_n \in P_x$ に対し

$f_{P_x}(b_1, \dots, b_n) = [f_{P(u)}(a_1, \dots, a_n)]_x$ for some $u \ni x, a_1, \dots, a_n \in P(u)$ s.t.

$[a_k]_x = b_k \quad (1 \leq k \leq n)$ により与えらる。上の定義は $u, a_1, \dots, a_n \in P(u)$

のとり方によらない。また $R(x_1, \dots, x_n)$: n -ary atomic formula

$b_1, \dots, b_n \in P_x$ に対し, $P_x \models R(b_1, \dots, b_n) \iff \exists u \ni x \exists a_1, \dots, a_n \in P(u)$

s.t. $[a_k]_x = b_k \quad (1 \leq k \leq n) \quad P(u) \models R(a_1, \dots, a_n)$ とする。以上の定

義より P_x は \mathcal{L} -structure とする。 (X, P) : sheaf of structures

に対し $P(X)$ を global sections of (X, P) と呼ぶ。

X : top. sp. A : \mathcal{L} -structure とする。 A に discrete top. を与

けた時, $P(u) = \{f \mid f: u \xrightarrow{\text{conti}} A\} \quad (u \in \mathcal{O}(X))$, $P_\alpha^u(f) = f|_{u_\alpha} \quad (u_\alpha \subset u$

$f \in P(u)$), C : constant symbol in \mathcal{L} に対し $C_{P(u)}(x) = C_A \quad (x \in u)$

f : function symbol in \mathcal{L} に対し $f_{P(u)}(f_1, \dots, f_n)(x) = f_A(f_1(x), \dots, f_n(x))$

$P(u) \models R(f_1, \dots, f_n) \Leftrightarrow \forall x \in u \ A \models R(f_1(x), \dots, f_n(x))$ により決まる

sheaf of structures を constant A -sheaf と呼び、 (X, A) と書き $P(X)$ を特に $\Gamma(X, A)$ と書くことにする。

次の条件(*), (**) を満たす sheaf of structures (X, P) をそれぞれ (*)-sheaf, (**) -sheaf と呼ぶことにする。

$$(*) \quad \forall x \in X \ \forall b \in P_x \ \exists a \in P(X) \ [a]_x = b$$

(**) X : Boolean space, 任意の formula φ , 任意の $a_1, \dots, a_n \in P(X)$ に対し $\{x \in X \mid P_x \models \varphi([a_1]_x, \dots, [a_n]_x)\} \in C(X)$ である。

但し $C(X)$: X の clopen set 全体

(条件 (**)) は Comer's condition と呼ばれている。[2])

sentence φ が任意の sheaf of structures (resp., constant sheaf (*)-sheaf, (**) -sheaf) に於いて, global section が存在して, 任意の stalk で φ が成立するならば, 常に φ が global sections で成立する時, φ を sheaf sentence (constant sheaf sentence, (*)-sheaf sentence, (**) -sheaf sentence) と呼ぶ。

Remark M_\emptyset では empty structure を除外していい。しかし, \mathcal{L} に constant symbol がある場合は M_\emptyset に empty structure はない。従って constant symbol がある時, 常に global section が存在する。しかし, 空の場合には, empty であることもありうる。

§1 Constant sheaf sentence

Lemma 1.1 constant A -sheaf (X, A) に於いて, $\Gamma(X, A)$ は任意の formula φ に対し $\llbracket \varphi(f_1, \dots, f_n) \rrbracket = \{x \in X \mid A \models \varphi(f_1(x), \dots, f_n(x))\}$ と value を決めることにより, Maximum Principle, Finite completeness property を満たす $C(X)$ -valued structure となる。

proof) $f_1, \dots, f_n \in \Gamma(X, A)$ に対し $U_x = \bar{f}_1'(f_1(x)) \cap \dots \cap \bar{f}_n'(f_n(x))$ とおくと U_x は clopen set であり, $X_0 = \{x \in X \mid A \models \varphi(f_1(x), \dots, f_n(x))\} = \bigcup_{x \in X_0} U_x$, $X_1 = \{x \in X \mid A \models \neg \varphi(f_1(x), \dots, f_n(x))\} = \bigcup_{x \in X_1} U_x$ で $X_0 \cap X_1 = \emptyset$, $X_0 \cup X_1 = X$ であるから, $\llbracket \varphi(f_1, \dots, f_n) \rrbracket = \{x \in X \mid A \models \varphi(f_1(x), \dots, f_n(x))\} \in C(X)$ である。

Boolean Algebra としての $C(X)$ の $+$, \cdot , \sim は集合としての \cup , \cap , c , であるから, $\llbracket \varphi \vee \psi \rrbracket = \llbracket \varphi \rrbracket + \llbracket \psi \rrbracket$, $\llbracket \varphi \wedge \psi \rrbracket = \llbracket \varphi \rrbracket \cdot \llbracket \psi \rrbracket$,

$\llbracket \neg \varphi \rrbracket = \sim \llbracket \varphi \rrbracket$ は明らか。また $\llbracket \exists y \varphi(y, f_1, \dots, f_n) \rrbracket$ は clopen であるから $\llbracket \exists y \varphi(y, f_1, \dots, f_n) \rrbracket = \bigcup_{g \in \Gamma(X, A)} \{x \in X \mid A \models \varphi(g(x), f_1(x), \dots, f_n(x))\}$
 $= \bigvee_{g \in \Gamma(X, A)} \llbracket \varphi(g, f_1, \dots, f_n) \rrbracket$ である。

同様にして $\llbracket \forall y \varphi(y, f_1, \dots, f_n) \rrbracket = \bigwedge_{g \in \Gamma(X, A)} \llbracket \varphi(g, f_1, \dots, f_n) \rrbracket$ である。

Equality Axiom を満たすことは定義より明らか。

従って $\Gamma(X, A)$ は $C(X)$ -valued structure である。

次に任意の $x \in X$ に対し, $A \models \exists y \varphi(y, f_1(x), \dots, f_n(x))$ のとき

$A \models \varphi(a_2, f_1(x), \dots, f_n(x))$ となる a_2 を fix する。また $A \not\models \exists y \varphi(y, \dots)$ のときは任意の a_2 を fix する。

$x, x' \in X$ に対し, $x \sim x' \iff f_1(x) = f_1(x') \wedge \dots \wedge f_n(x) = f_n(x')$ により

equivalence relation を決める。 X/\sim の代表元の集合 $\{x_\alpha\}$ とする。

そこで, $h(x) = a_{x_\alpha}$ iff $x \sim x_\alpha$ により $h: X \rightarrow A$ を決める。

任意の A の subset A' に対し, $h^{-1}(A') = \bigcup_{a_{x_\alpha} \in A'} U_{x_\alpha}$ である。

但し, $U_{x_\alpha} = f_1^{-1}(f_1(x_\alpha)) \cap \dots \cap f_n^{-1}(f_n(x_\alpha))$ 。従, h は連続である。

$A \models \exists y \varphi(y, f_1(x), \dots, f_n(x)) \iff A \models \varphi(h(x), f_1(x), \dots, f_n(x))$ より

$\llbracket \exists y \varphi(y, f_1, \dots, f_n) \rrbracket = \llbracket \varphi(h, f_1, \dots, f_n) \rrbracket$ 。よ, h Maximum Principle が成立

する。また, $u \in \mathcal{O}(x)$, $f, g \in \Gamma(x, A)$ に対し, $h(x) = f(x)$ かつ $x \in u$

$h(x) = g(x)$ otherwise により $h: X \rightarrow A$ を定義すると h は連続

で, $\llbracket h = f \rrbracket \supseteq u$, $\llbracket h = g \rrbracket \supseteq u^c$ であるから, Finite completeness

property を満たす。 \dashv

Lemma 1.2 (Ellentuck - Mansfield - Volger)

$\langle M, B \rangle$ を Maximum Principle, Finite completeness property を満たす B -valued structures とする。任意の \mathcal{L} -sentence φ に対し, Boolean Algebras の formula Φ と \mathcal{L} -sentences $\theta_1, \dots, \theta_n$ が存在して, $M \models \varphi$ iff $B \models \Phi(\llbracket \theta_1 \rrbracket, \dots, \llbracket \theta_n \rrbracket)$ が成り立つ。

Cor. 1.3 Maximum Principle, Finite completeness property

Almost two valued (任意の sentence φ に対し, $\llbracket \varphi \rrbracket = 1$ or $\llbracket \varphi \rrbracket = 0$ であること) を満たす, 任意の Boolean valued structures

$\langle M, B \rangle, \langle M', B' \rangle$ に対し, $B \equiv B'$ かつ 任意の sentence φ に対し

$\models \llbracket \varphi \rrbracket_M = 1 \text{ iff } \llbracket \varphi \rrbracket_{M'} = 1$ ならば $M \equiv M'$ である。

proof: Lemma 1.2 より明か。 \dashv

Th. 1.4 次の3つの条件は同値である。

1) φ は reduced power sentence である。

2) φ は constant sheaf sentence である。

3) φ は Boolean space 上の constant sheaf sentence である。

proof) 2) \rightarrow 3) は明か。

1) \rightarrow 2) φ を reduced power sentence とする。任意の top. sp. X に対し $C(X) \equiv 2^I/F$ とする I と I 上の filter F が存在する。

任意の \mathcal{L} -st. A に対し, Lemma 1.1 より $\Gamma(X, A)$ は Lemma 1.3 の仮定を満たす。reduced power A^I/F が Lemma 1.3 の仮定を満たすことは明らかである。また任意の sentence φ に対し, $\llbracket \varphi \rrbracket_{\Gamma(X, A)} = 1$ iff $A \models \varphi$ iff $\llbracket \varphi \rrbracket_{A^I/F} = 1$ である。従って

Lemma 1.3 より $\Gamma(X, A) \equiv A^I/F$ 。よって仮定より $A \models \varphi$ ならば $A^I/F \models \varphi$ であるから, $A \models \varphi$ ならば $\Gamma(X, A) \models \varphi$ である。

よって φ は constant sheaf sentence である。

3) \rightarrow 1) φ を Boolean space 上の constant sheaf sentence とする。上と同様にして任意の \mathcal{L} -st. A と任意の I, F (I 上の filter) に対し, Lemma 1.3 より $\Gamma((2^I/F)^*, A) \equiv A^I/F$ である。(但し $(2^I/F)^*$ は $2^I/F$ の dual space である。) 従って仮定より $A \models \varphi$ ならば

$\Gamma((2^{\mathbb{N}})^*, A) \models \varphi$ であるから, $A \models \varphi$ ならば $A^{\mathbb{N}} \models \varphi$ である。

よって φ は reduced power sentence である。 \dashv

Th 1.5 sheaf sentence はある Horn sentence に equivalent である。

proof) sheaf sentence は Th 1.4 より reduced power sentence であり, また direct product sentence でもあるから, reduced product sentence である。よってある Horn sentence に equivalent である。 \dashv

Th 1.5 により R. Mansfield の問題に対する肯定的な答が得られる。

§2 $(*)$ -sheaf sentences と $(**)$ -sheaf sentences

Th 2.1 i) $(*)$ -sheaf sentence はある Horn sentence に equivalent である。

ii) Special Horn sentence は $(*)$ -sheaf sentence である。

proof) i) constant sheaf は $(*)$ -sheaf である。また $(*)$ -sheaf sentence は direct product sentence でもあるから, Th 1.5 と同様に $(*)$ -sheaf sentence はある Horn sentence に equivalent である。

ii) 条件 (ii) は global sections が stalks の subdirect product であることを示している。よって Special Horn sentence は (ii)-sheaf sentence である。

Th 2.2 次の 2 条件は同値である。

i) φ は (**) -sheaf sentence である。

ii) φ は ある Horn sentence に equivalent である。

proof) i) \rightarrow ii) (**) -sheaf sentence は Boolean space 上の constant sheaf sentence であり、また finite direct product sentence でもあるから、ある Horn sentence に equivalent である。

ii) \rightarrow i) Horn formula φ が (**) -sheaf で保存されることを示せば十分である。Horn formula の構成によりこの induction で証明する。universal Horn formula は任意の sheaf で保存されるから、Horn formula $\exists y \varphi(x)$ が (**) -sheaf で保存されることを示せば十分である。(**) -sheaf の global sections は条件 (**) より Maximum Principle を満たす Boolean valued structure となる。従って $(X, P); (**) -sheaf$ とすると、 $\forall x \in X \ P_x \models \exists y \varphi(x)$ i.e. $\llbracket \exists y \varphi(x) \rrbracket = 1$ ならば、ある $f \in P(x)$ が存在して $\llbracket \varphi(f) \rrbracket = 1$ i.e. $\forall x \in X \ P_x \models \varphi(\sqcup x)$ である。よって induction の仮定より $P(x) \models \varphi(f)$ であるから、 $P(x) \models \exists y \varphi(x)$ となる。 \dashv

H. Volgerはこゝとは違、た方法により、R. Mansfieldの問題を解いてゐる ([7])。

REFERENCES

- [1] C. C. Chang and H. J. Keisler, Model theory,
North Holland, Amsterdam 1973.
- [2] S. D. Comer, Elementary properties of structures of sections,
Bol. Soc. Math. Mexicana, Ser. 2 19 (1974) pp 78-85.
- [3] E. Ellentuck, Boolean valued rings,
Fund. Math. 96 (1977) pp 67-86.
- [4] D. P. Ellerman, Sheaves of structures and generalized
ultraproducts,
Ann. Math. Logic, 7 (1974) pp 163-195.
- [5] R. Mansfield, Sheaves and normal submodels,
J. of Symbolic Logic, 42 (1977) pp 241-250.
- [6] H. Volger, The Feferman-Vaught theorem revisited,
Colloq. Math. 36 (1976) pp 1-11.
- [7] ———, Preservation theorems for limits of structures
and global sections of sheaves of structures,
Math. Z. 166 (1979) pp 27-53.